

まおうとう  
麻黄湯

こうそきん  
香蘇散

けいしかりょうじゅつぶとう  
桂枝加苓朮附湯

かつこんとう  
葛根湯

よくいんにんとう  
薏苡仁湯

しゃくやくかんぞうとう  
芍薬甘草湯

しょうきいことう  
小柴胡湯

まきょうよくかんとう  
麻杏薏甘湯

きいこかりゅうこつぼれいとう  
柴胡加竜骨牡蛎湯

はんげこうぼくとう  
半夏厚朴湯

そけいかっけつとう  
疎経活血湯

よくかんさん よくかんさん かちんぴはんげ  
抑肝散・抑肝散加陳皮半夏

小青竜湯

ちょうとうきん  
釣藤散

けいしかりゅうこつぼれいとう  
桂枝加竜骨牡蛎湯

さいこけいしとう  
柴胡桂枝湯

とうきしぎやくかごしゆしょうきょうとう  
当帰四逆加呉茱萸生姜湯

さんそうにんとう  
酸棗仁湯

ばくもんどうとう  
麦門冬湯

ごしゆゆとう  
呉茱萸湯

かみきひとう  
加味帰脾湯

けいしとう  
桂枝湯

けいしかじゅつぶとう  
桂枝加朮附湯

しょうけんちゅうとう  
小建中湯

<p>9-8 痛</p> <p>汗が出、手足が冷えてこわばる・関節痛・神経痛</p> <p>筋肉のびくつきのある</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-9 風</p> <p>神経過敏・胃腸の弱い・血の道症</p> <p>偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-1 風</p> <p>初期・ふしぶしの痛み</p> <p><small>jis式</small></p>	カ マ
<p>9-9 痛</p> <p>筋肉の痙攣・こむらがえり・連用は避ける</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎・虚血性心不全</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-1 痛</p> <p>いぼ・手足のあれ・関節筋肉の痛み</p> <p><small>jis式</small></p>	カ マ	<p>9-2 風</p> <p>汗をかいてない初期・肩こり</p> <p>肝機能障害・偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ マ
<p>5-1 眠</p> <p>便秘などを伴う高血圧・神経症・小児夜泣き</p> <p>肝機能書・間質性肺炎</p> <p><small>jis式</small></p>	ダ	<p>9-2 痛</p> <p>関節や筋肉のはれ・痛み</p> <p><small>jis式</small></p>	カ マ	<p>9-3 風</p> <p>後期・舌に白苔</p> <p>インターフェロンで間質性肺炎</p> <p><small>jis式</small></p>	カ
<p>5-2 眠</p> <p>怒りやすい・イライラ・歯ざしり</p> <p>心不全を起こす可能性あり</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-3 痛</p> <p>しびれがあるものの関節痛</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-4 風</p> <p>気分がふさぐ・喉のつかえ</p> <p>カマダ無し</p> <p><small>jis式</small></p>	
<p>5-3 眠</p> <p>興奮しやすい・小児夜泣き・眼精疲労</p> <p>偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-4 痛</p> <p>慢性頭痛・高血圧</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-5 風</p> <p>うすい水様の痰</p> <p>間質性肺炎・肝機能障害・偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ マ
<p>5-4 眠</p> <p>心身が疲れ・不眠・精神不安</p> <p>1週間位服用しても改善が見られないなら受診</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-5 痛</p> <p>下肢の冷えが強く・月経痛</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-6 風</p> <p>中期から後期・腹痛・吐気・胃腸炎</p> <p>間質性肺炎・肝機能障害・膀胱炎様症状</p> <p><small>jis式</small></p>	カ
<p>5-5 眠</p> <p>心身が疲れ・血色悪く熱感を伴う・貧血</p> <p>偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-6 痛</p> <p>頭痛に伴う吐気・しゃっくり</p> <p><small>jis式</small></p>		<p>9-7 風</p> <p>痰が切れにくい咽頭の乾燥感しわがれ声</p> <p>水溶痰の多い人：不向き</p> <p><small>jis式</small></p>	カ
<p>5-1 瘡</p> <p>小児虚弱体質・小児夜尿症・夜泣き</p> <p>体重辺りのグリチルリチン酸の量に注意</p> <p><small>jis式</small></p>		<p>9-7 痛</p> <p>汗が出、手足が冷えてこわばる・関節痛</p> <p><small>jis式</small></p>	カ	<p>9-8 風</p> <p>汗が出るかぜの初期</p> <p>偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	カ

さいこかりゅうこつぼれいとう  
柴胡加竜骨牡蛎湯

はんげこうぼくとう  
半夏厚朴湯

あんちゅうさん  
安中散

けいしかりゅうこつぼれいとう  
桂枝加竜骨牡蛎湯

ばくもんどうとう  
麦門冬湯

りっくんしとう  
六君子湯

よくかんさん  
抑肝散

かんぞうとう  
甘草湯

にんじんとう  
人參湯

よくかんさんかちんぴはんげ  
抑肝散加陳皮半夏

びゃっこかにんじんとう  
白虎加人參湯

だいおうぼたんぴとう  
大黃牡丹皮湯

ごことう  
五虎湯

きょうせいはてきがん  
響声破笛丸

ましにがん  
麻子仁丸

しんぴとう  
神秘湯

ききょうとう  
桔梗湯

けいしかしゃくやくとう  
桂枝加芍薬湯

まきょうかんせきとう  
麻杏甘石湯

くふうげどくとう さん  
驅風解毒湯・散

だいおうかんぞうとう  
大黃甘草湯

さいぼくとう  
柴朴湯

へいいきん  
平胃散

さんおうしゃしんとう  
三黄瀉心湯

<p>4-2 胃</p> <p>腹部は力がなく・胃痛・胸焼け、げっぷ</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-5 咳</p> <p>嘔気・不安神経症・喉のつかえ・つわり</p> <p>カマダ無し</p> <p>jis式</p>		<p>5-2 瘡</p> <p>1週間くらい服用しても症状の改善が見られないときは服用を中止して専門家に相談</p> <p>jis式</p>	
<p>4-3 胃</p> <p>みぞおちがつかえて疲れやすい・貧血・胃下垂</p> <p>肝機能障害</p> <p>jis式</p>		<p>7-6 咳</p> <p>痰が切れにくい・咽頭乾燥感・水様性痰は不向き</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p> <p>jis式</p>	カ	<p>5-3 瘡</p> <p>1週間くらい服用しても症状の改善が見られないときは服用を中止して専門家に相談</p> <p>jis式</p>	
<p>4-4 胃</p> <p>疲れやすく手足が冷えやすい胃腸虚弱</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-7 咳</p> <p>激しい咳・口内炎・痔</p> <p>甘草のみの構成</p> <p>jis式</p>	カ	<p>5-4 瘡</p> <p>1週間くらい服用しても症状の改善が見られないときは服用を中止して専門家に相談</p> <p>jis式</p>	
<p>4-1 腸</p> <p>下腹部痛があり便秘しがちな人の月経不順</p> <p>jis式</p>		<p>4-1 喉</p> <p>熱感と口喝の強い喉の渴き・皮膚のかゆみ</p> <p>比較的長期間服用</p> <p>ダ</p> <p>jis式</p>	カ	<p>5-5 瘡</p> <p>1週間くらい服用しても症状の改善が見られないときは服用を中止して専門家に相談</p> <p>jis式</p>	
<p>4-2 腸</p> <p>便が硬く塊状</p> <p>jis式</p>		<p>4-2 喉</p> <p>しわがれ声・咽頭不快</p> <p>ダ</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-1 咳</p> <p>咳が強くなる</p> <p>カマ</p>	
<p>4-3 腸</p> <p>しぶり腹・腹痛・下痢・便秘</p> <p>jis式</p>	カ	<p>4-3 喉</p> <p>咳が出る扁桃炎・扁桃周囲炎</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-3 咳</p> <p>喘息・息苦しさ・痰が少ない小児の喘息</p> <p>カマ</p>	
<p>4-4 腸</p> <p>便秘・便秘に伴う頭重</p> <p>jis式</p>	カ	<p>4-4 喉</p> <p>喉が腫れる扁桃炎・扁桃周囲炎</p> <p>うがいをしながら少しずつ服用</p> <p>ダ</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-2 咳</p> <p>咳が出て時に喉が渴く咳・小児喘息</p> <p>間質性肺炎</p> <p>カマ</p>	
<p>3-1 循</p> <p>のぼせ顔面紅潮・血の道症・高血圧・鼻血</p> <p>鼻血は5～6回使用して改善しないなら相談</p> <p>jis式</p>		<p>4-1 胃</p> <p>食べすぎによる胃のもたれ・消化不良</p> <p>ダ</p> <p>jis式</p>	カ	<p>7-4 咳</p> <p>小児の喘息・気管支喘息</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎・膀胱炎様症状</p> <p>jis式</p>	カ

しちもつこうかとう  
七物降下湯

ちよれいとう  
猪苓湯

しもつとう  
四物湯

りょうけいじゆつかんとう  
苓桂朮甘湯

けいしぶくりょうがん  
桂枝茯苓丸

とうきしゃくやくさん  
当歸芍薬散

おつじとう  
乙字湯

とうかくじょうぎとう  
桃核承気湯

しょうふうさん  
消風散

きゅうききょうがいとう  
芎歸膠艾湯

うんせいいん  
温清飲

いんちんこうとう  
茵陳蒿湯

りゅうたんしゃかんと  
竜胆瀉肝湯

ごしゃくさん  
五積散

じゅうみはいどくとう  
十味敗毒湯

ごしゃじんきがん  
牛車腎気丸

うんけいとう  
温経湯

とうきいんし  
当歸飲子

はちみじおうがん  
八味地黄丸

かみしょうようさん  
加味逍遥散

かっこんとうかせんきゅうしんい  
葛根湯加川芎辛夷

ろくみがん  
六味丸

さいこけいしかんきょうとう  
柴胡桂枝乾姜湯

けいがいれんぎょうとう  
荊芥連翹湯

<p>9-8 婦 産後・流産後の回復・しもやけ・しみ</p>		<p>5-5 尿 口が渇くものの排尿困難・排尿痛</p>		<p>3-2 循 顔色が悪くて疲れやすく 高血圧</p> <p>15歳未満の小児への使用は避ける</p>	
<p>9-9 婦 冷性・産前産後・流産後の障害(めまい・むくみ)</p>		<p>9-1 婦 のぼせて足が冷え・月経痛・打ち身</p>		<p>3-3 循 ふらつき・神経過敏・水毒の排出</p> <p>強心作用の生薬は含まれない</p>	力
<p>4-1 皮 痒みが強く分泌物が多・局所熱感</p>	力	<p>9-2 婦 のぼせ便秘・月経時や産後の精神不安</p> <p>肝機能障害</p>	力	<p>2-1 痔 便秘傾向のあるものの</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p>	力
<p>4-2 皮 尿量少なく便秘するものの 蕁麻疹・口内炎</p>	ダ	<p>9-3 婦 皮膚はカサカサで色つやが悪い</p> <p>肝機能障害</p>	ダ	<p>2-2 痔 冷え性・出血傾向があり・胃腸障害がないもの</p>	ダ
<p>4-3 皮 化膿性皮膚疾患・水虫</p>	力	<p>9-4 婦 更年期障害・胃腸炎・月経痛・感冒</p> <p>胃腸の弱い人・発汗の著しい人は不向き</p>	力 マ	<p>5-1 尿 尿の濁り・こしけ(おりもの)</p>	力
<p>4-4 皮 冷え性・皮膚乾燥・湿疹・皮膚炎(分泌物少)</p>	力	<p>9-5 婦 手足がほてり唇が渇く・手荒れ・こしけ</p> <p>胃腸の弱い人</p>	力	<p>5-2 尿 四肢が冷えやすく尿量減少・高齢者のかすみ目</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p>	
<p>4-1 鼻 鼻詰・蓄膿症</p>	力 ダ	<p>9-6 婦 のぼせ・いらだち精神神経症状・便秘傾向</p> <p>肝機能障害・腸間膜静脈硬化症</p>	力	<p>5-3 尿 多尿・尿漏れ・夜間尿・高齢者のかすみ目</p>	
<p>4-2 鼻 皮膚が浅黒く手足の裏に脂汗・鼻炎・ニキビ</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p>	力	<p>9-7 婦 貧血・神経過敏・更年期障害・かぜの後期</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p>	力	<p>5-4 尿 手足のほてり・排尿困難・口渇</p>	

しんいせいはいとう  
辛夷清肺湯

おうれんげどくとう  
黄連解毒湯

ほちゅうえっきとう  
補中益気湯

しょうせいりゅうとう  
小青竜湯

せいじょうぼうふうとう  
清上防風湯

しうんこう  
紫雲膏

だいきいことう  
大柴胡湯

ぼういおうぎとう  
防己黄耆湯

ちゅうおうこう  
中黄膏

ぼうふうつうしょうさん  
防風通聖散

じゅうぜんだいほうとう  
十全大補湯

<p>2-2 <b>滋</b></p> <p>病後・術後の虚弱・感冒</p> <p>肝機能障害・間質性肺炎</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>カ</p>	<p>5-3 <b>漢</b></p> <p>のぼせ・顔が赤くイライラ・ 鼻血・二日酔い</p> <p>肝機能書・間質性肺炎・ 腸間膜動脈硬化症</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>4-3 <b>鼻</b></p> <p>濃い鼻汁・熱感をともなう ものの鼻づまり</p> <p>肝機能書・間質性肺炎・ 腸間膜動脈硬化症</p> <p><small>jis式</small></p>	
<p>2-1 <b>外</b></p> <p>しもやけ・ひび・あかぎれ・ うおのめ</p> <p><small>jis式</small></p>		<p>5-4 <b>漢</b></p> <p>赤ら顔・のぼせ・ニキビ</p> <p>肝機能書・ 偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>カ</p> <p>4-4 <b>鼻</b></p> <p>うすい水様の痰・ アレルギー性鼻炎</p> <p><small>jis式</small></p>	
<p>2-2 <b>外</b></p> <p>打ち身・捻挫</p> <p><small>jis式</small></p>		<p>5-5 <b>漢</b></p> <p>水太り・肥満・多汗・むくみ</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>カ</p> <p>5-1 <b>漢</b></p> <p>脇腹からみぞおちが苦しい 便秘・胃炎</p> <p>肝機能書・間質性肺炎</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>ダ</p>
<p>2-1 <b>滋</b></p> <p>病後・術後の体力低下・ 貧血・手足の冷え</p> <p>肝機能障害</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>カ</p>	<p>5-2 <b>漢</b></p> <p>腹部皮下脂肪多く便秘がち 高血圧</p> <p>肝機能書・間質性肺炎・ 偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>カ</p> <p>5-2 <b>漢</b></p> <p>腹部皮下脂肪多く便秘がち 高血圧</p> <p>肝機能書・間質性肺炎・ 偽アルドステロン症</p> <p><small>jis式</small></p>	<p>ダ カ マ ダ</p>